

ATAK Nástraha na mravence AMP 1 RB

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Účel použití a forma přípravku: Dóza (s gelem) na likvidaci mravenců k okamžitému použití (biocidní insekticid - sk. 18). ATAK Nástraha na mravence AMP 1 RB je velmi přitažlivá gelová návnada založená na vodě a různých cukrových složkách, které mravencům chutnají. Je určena k dlouhodobé likvidaci mravenců. Obsahuje ztrpčující prostředek (hořké činidlo - denatonium benzoate) proti nežádoucímu náhodnému požití. Je určen pro amatérské i profesionální použití.

Návod na použití a dávkování

Dóza (s gelem): Pro maximální účinnost umístěte dózy podél stěn na místa, jimiž mravenci procházejí nebo kde se zdržují, v kuchyních, na terasách, ke vstupům do jejich hnízd. Dózu položte vodorovně na místo, jímž mravenci procházejí. Vylomte dvě označená místa umožňující mravencům vstoupit do dózy. V případě potřeby dózy vyměňte za nové po 1-3 týdnech po prvním ošetření v závislosti na úrovni zamoření. Působení biocidu ukončíte odstraněním návnadových dóz.

Dávkování: Aplikujte dózu (s gelem) na 2-3 místa na m² (0,2-0,3 g/m²).

Hlavní období ošetření v měsících

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | • | • | •• | •• | •• | •• | •• | • | | |

Časové období potřebné pro biocidní účinek: Ke zničení hnízd mravenců dochází po 5-7 dnech.

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repetent pro zvířata.

Pokyny pro první pomoc

Při nadýchání: Vyjděte na čerstvý vzduch. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Po styku s kůží: Omýt vodou a mýdlem. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Při zasažení očí: Vyplachovat široce otevřené oči pod tekoucí vlažnou vodou alespoň 10 minut. Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

Při požití: Vypláchnout ústa větším množstvím vody. Nevyvolávat zvracení. V případě potíží vyhledat lékaře.

Poznámky pro lékaře: Symptomatická léčba

LÉKAŘSKÁ POMOC:

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažena v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku.

Obsahuje / účinná látka: acetamiprid 1 g/kg
Dále obsahuje hořké činidlo (denatonium benzoate)

P věty

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal podle předpisů.

Upozornění:

Uchovávejte pouze v původním obalu. Produkt lze aplikovat v přítomnosti osob a zvířat. Není nutné větrání mezi aplikací produktu a pobytem v ošetřených prostorách.

Nepoužitý produkt odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Nevylévat do kanalizace a vodních toků. Zákaz opětovného použití obalu.

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.

Skladování: Skladovat při teplotě 5 až 35 °C. Mráz může produkt zničit.

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR 21641/2012/SOZ

Balení: 3 dózy

Výrobce: Kwizda-France S.A.S, 30, Avenue de l'Amiral Lemonnier, F-78160 Marly-le-Roi, Francie,

Tel : +33 (0)1 39 16 09 69

Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, tel.: +420 553 626 660, www.agrobio.cz