

ATAK PYR Granulat Chrysanthemum biocid

ATAK PYR Granulat Chrysanthemum je mikrogranulát připravený k použití pro kontrolu amerických, německých, orientálních **švábů, klíšťat, blech a mravenců** (mravenec černý, mravenec argentinský a **mravenec faraon**). Výrobek lze aplikovat **ve 3 různých formách: posypem, postřikem a zálivkou.**

Insekticidní mikrogranule pro kontrolu lezoucího hmyzu v interiéru i exteriéru (v budovách a jejich okolí), pro **neprofesionální použití**.

Insekticid biocidního přípravku PT18

Kód přípravku: GR (granule)

Číslo šarže a datum použitelnosti: viz balení

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Složení

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt z otevřených a zralých květů *Tanacetum cinerariifolium* získaný s použitím superkritického oxidu uhličitého (č. CAS: 89997-63-7): 0,25 g/kg Piperonyl butoxid (č. CAS: 51-03-6): 1,25 g/kg

Obsahuje hořkou látku (denatonium-benzoát).

Hmotnost: 150 g, 300 g



Standardní věty o nebezpečnosti

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Obsah/obal zlikvidujte vhodným způsobem v souladu s místními/národními předpisy.

Nakládání s přípravkem a odpady a skladování:

Nepoužívejte znovu prázdné kontaminované obaly pro jiné účely. Aplikujte a skladujte pouze v místech mimo dosah dětí a zvířat. Produkt neaplikujte přímo na rostliny. Neznečišťujte vodu produktem. Neznečišťujte potraviny, jídelní pomůcky ani povrchy, které přicházejí do styku s potravinami. Nevylévejte do kanalizace.

Neznečišťujte vodní tělesa nebo toky chemikáliemi nebo použitým obalem. Po použití si umyjte ruce a exponovanou kůži.

Skladujte na chladném, dobře větraném a suchém místě.

Nevyhazujte odpad ani zbytky spolu s domácím odpadem, nesypejte ho do dřezu nebo toalety. Likvidace podle úředních předpisů.

První pomoc

Při nadýchání:

Přívod čerstvého vzduchu; v případě potíží se poradte s lékařem.

Při styku s kůží:

Obecně platí, že přípravek není dráždivý pro pokožku, ale doporučuje se postižené oblasti pokožky důkladně umýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout.

Pokud podráždění kůže přetrvává, vyhledejte lékaře.

Při zasažení očí:

Oči několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.

Při požití:

Vypláchněte ústa vodou. **NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo etiketu.

Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:

Symptomatická léčba

LÉKAŘSKÁ POMOC

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:

Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích:

+420224919293 nebo +420224915402

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku.

Pravděpodobné další přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky: nejsou známy.

Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh: MZDR 17389/2022/OBP

Výrobce / Držitel povolení: Kwizda-France S.A.S, 30, Avenue de l'Amiral Lemonnier, F-78160 Marly-le-Roi, Francie, Tel : +33 (0)1 39 16 09 69.

Distributor pro ČR: AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice, Česká republika. Tel.: +420 553 626 660, poradna@agrobio.cz
www.agrobio.cz

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A PEČLIVĚ JE DODRŽUJTE.

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

DÁVKOVÁNÍ

1) Proti švábům (*Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*), **klíšťatům** (*Ixodes ricinus*) a **blechám** (*Ctenocephalides felis*)

Místo: uvnitř a venku (v budovách a jejich okolí)

K ochraně aplikujte přípravek na 1/4 povrchu (3 m² k ochraně 12 m²).

Posyp: Rozsypte jemnou vrstvu ATAK PYR Granulat Chrysanthemum při dávce 80 g/m².

Postřík: Smíchejte ATAK PYR Granulat Chrysanthemum v postřikovači s vodou při dávce 200 g na litr. Nastříkejte jeden litr směsi na 5 m² (pro ochranu 20 m²).

2) Proti mravencům (*Lasius niger*, *Linepithema humile*, *Monomorium pharaonis*)

Místo: uvnitř a venku (v budovách a jejich okolí)

K ochraně aplikujte přípravek na 1/4 povrchu (3 m² k ochraně 12 m²).

Posyp: Rozsypte jemnou vrstvu ATAK PYR Granulat Chrysanthemum při dávce 20 g/m².

Postřík: Smíchejte ATAK PYR Granulat Chrysanthemum v postřikovači s vodou při dávce 100 g na litr. Nastříkejte jeden litr přípravku na 5 m² (pro ochranu 20 m²).

Zálivkou: Tato aplikace je určena pouze pro venkovní použití. Smíchejte ATAK PYR Granulat Chrysanthemum v zavlažovací nádobě s dávkou 20 g na litr vody. Naneste 1 litr přípravku na m².

Místo: venkovní

Malé hnízdo (ošetření povrchu o ploše: 1 m²)

Posyp: Rozsypte 20 g na hnízdo.

Postřík: Smíchejte v postřikovači 20 g na 200 ml vody. Aplikujte na hnízdo a kolem něj.

Zálivkou: Smíchejte 20 g na 1 l vody. Aplikujte na hnízdo a kolem něj.

Velké hnízdo (ošetření povrchu o ploše: 2 m²)

Posyp: Rozsypte 40 g na hnízdo.

Postřík: Smíchejte v postřikovači 40 g na 400 ml vody. Aplikujte na hnízdo a kolem něj.

Zálivkou: Smíchejte 40 g na 2 l vody. Aplikujte na hnízdo a kolem něj.

NÁVOD POUŽITÍ

Doba používání: celý rok

Lezoucí hmyz obecně

Produkt aplikujte tam, kde hmyz cestuje a/nebo zůstává v koutech, škvírách, prasklinách, štěrbinách, podél základové desky, za domácími spotřebiči, všemi horkými, vlhkými nebo tmavými místy příznivými pro šíření škůdců. Pro parazity: na koberce a kolem postele pro domácí mazlíčky.

Nástup účinku biocidů: Funguje během několika minut v návaznosti na kontakt nebo požití přípravku. **Ochrana do 12 týdnů.**

Pokyny pro čištění: Vyčištěné povrchy nečistěte: čištění pomocí klasického čisticího prostředku a horké vody zastaví biocidní účinek.

Četnost aplikace: Léčebné ošetření v případě zamoření (normální četnost aplikace: 1/rok). V případě opětovného zamoření aplikaci zopakujte. Pokud jsou ošetřené povrchy čištěny nebo vystaveny povětrnostním vlivům, obnovte aplikaci až do konce zamoření. **Nepřekračujte 6 ošetření za rok.**

Specifické cílové nároky organismů:

1) Švábi (*Blatella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*), **klíšťata** (*Ixodes ricinus*) a **blechy** (*Ctenocephalides felis*)

Produkt aplikujte tam, kde hmyz cestuje a/nebo pobývá, v koutech, škvírách, prasklinách, štěrbinách, podél podlahové desky, za domácími spotřebiči: **pro šváby:** všechna horká, vlhká nebo tmavá místa příznivá pro šíření švábů.

Pro klíšťata a blechy: na koberce a kolem postele pro domácí mazlíčky postele.

Nástup účinku biocidů: Funguje v rámci minut v návaznosti na kontakt nebo požití přípravku.

Ochrana do 12 týdnů (1 měsíc pro blechy a 15 dní pro klíšťata).

Pokyny pro čištění: Nečistěte ošetřené povrchy: čištění pomocí klasického čisticího prostředku a horké vody zastaví biocidní účinek.

Četnost aplikace: Léčebná opatření v případě zamoření (běžná četnost aplikace: 1/rok). V případě opětovného zamoření opakujte aplikaci každé 2 týdny (1 měsíc v případě zamoření blechami). Pokud jsou ošetřené povrchy čištěny nebo vystaveny povětrnostním vlivům, obnovte aplikaci až do konce zamoření. **Nepřekračujte 6 ošetření za rok.**

2) Mravenci (*Lasius niger*, *Linepithema humile*, *Monomorium pharaonis*)

Aplikace: uvnitř a venku (v budovách a jejich okolí)

Produkt aplikujte tam, kde mravenci cestují a/nebo pobývají podél zdí v prasklinách a štěrbinách.

Nástup účinku biocidů: Funguje v rámci minut v návaznosti na kontakt nebo požití přípravku.

Ochrana do 6. týdnů.

Pokyny pro čištění: Nečistěte ošetřené povrchy: čištění pomocí klasického detergetu a horké vody zastaví biocidní účinek.

Četnost aplikace: Léčebná opatření v případě zamoření (běžná četnost aplikace: 1/rok). V případě opětovného zamoření opakujte aplikaci každý měsíc. Pokud jsou ošetřené povrchy čištěny nebo vystaveny povětrnostním vlivům, obnovte aplikaci až do konce zamoření. **Nepřekračujte 6 ošetření za rok.**

Aplikace: venkovní

Aplikujte produkt na a kolem hnízda na povrch mezi 1-2 m².

Nástup účinku biocidů: Funguje v rámci minut v návaznosti na kontakt nebo požití přípravku.

Ochrana do 6. týdnů.

Pokyny pro čištění: Nečistěte ošetřené povrchy: čištění pomocí klasického detergetu a horké vody zastaví biocidní účinek.

Četnost aplikace: Léčebná opatření v případě. Pokud hnízdo není zcela zničeno po 6 týdnech přejděte k druhé aplikaci (normální frekvence aplikace: 1/rok).
Nepřekračujte 6 ošetření za rok.