



znovu uzavíratelný ZIP sáček
Sáček znovu uzavřete směrem od kraje.



RataStop
RATIDIF SENSITIVE PASTA FLUO



Fluorescenční měkká nástraha na hlodavce

Rodenticidní nástraha k přímému použití ve formě pasty (typ přípravku 14) k použití širokou veřejností, k hubení myši domácí (uvnitř budov) a potkana obecného (uvnitř budov a ve venkovních prostorách kolem budov).

Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti drenážních systémů, kde mohou přijít do styku s vodou. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku. Na konci období deratizace odstraňte zbývající nástrahu nebo deratizační staničky.

RATIDIF SENSITIVE PASTA FLUO je nástraha k přímému použití ve formě pasty v jednodávkových sáčcích po 15 g k hubení myši domácí (*Mus musculus*) a potkana obecného (*Rattus norvegicus*) ve všech vývojových stádiích (dospělí jedinci a mláďata), obsahující difenakum, antikoagulační účinnou látku druhé generace. Díky jeho způsobu působení dochází k smrti hlodavců bez vyvolání podezření vůči návnadě u ostatních členů kolonie.

Rodenticid RATIDIF SENSITIVE PASTA FLUO se vyznačuje následujícími inovativními a patentovanými vlastnostmi:

- Technologie FLUO-NP®: díky technologii s fluorescenčním pigmentem je nástraha snadno identifikovatelná i za špatných světelných podmínek. Po požití návnady je trus hlodavců díky fluorescenční formulaci jasně viditelný pod ultrafialovým světlem, což poskytuje možnost sledovat aktivitu hlodavců.

- PASTA PLUS® (evropský patent č. 1 279 334 B1), je patentovaná formulace která kombinuje vyváženou směs složek potravinového původu, jako je mléčná moučka, cukr a tuky obohacené obilovinami, obzvláště chutnou pro vyše uvedené druhy hlodavců.

Díky jeho vysoké palatabilitě je nástraha ve formě pasty extrémně všestranná a je vhodná pro použití v oblastech, které se vyznačují silnou potravinovou konkurencí.

RATIDIF SENSITIVE PASTA FLUO obsahuje hořkou látku (*Denatonium - benzodol*), která pomáhá předcházet konzumaci lidmi.

Typ složení: Pasta

Účinná látka: Difenakum 0,0029% (= 0,029g/kg) (CAS: 56073-07-5)

Číslo povolení biocidního přípravku: CZ-0020139-0000

Doba použitelnosti: 2 roky od data uvedené na obalu

Číslo šarže a datum výroby: viz obal

OPATŘENÍ KE ZMÍRNĚNÍ RIZIKA:

Zvažte preventivní kontrolní opatření (ucpěte díry, odstraňte případné potraviny a nápoje co nejdříve) s cílem zvýšit příjem přípravku a snížit pravděpodobnost opětovného zamoření.

Nepoužívejte antikoagulační rodenticidy jako stále nástrahy (např. k prevenci zamoření hlodavci nebo k odhalení aktivity hlodavců).

Při použití tohoto přípravku by mělo dojít k vyhubení hlodavců do 35 dní.

V případě, že máte na konci deratizace podezření na nedostatečnou účinnost přípravku (tj. pokud stále pozorujete aktivitu hlodavců), vyžádejte si radu dodavatele přípravku nebo se obraťte na deratizační službu. V průběhu deratizace vyhledávejte a odstraňujte uhybné hlodavce, a to nejméně se stejnou frekvencí, s jakou kontrolujete deratizační staničky.

Uhybné hlodavce likvidujte v souladu s místními požadavky. **Používat pouze v deratizačních stanicích odolných proti násilnému otevření.**

Označte deratizační staničky v souladu s doporučeními uvedenými u přípravku.

INSTRUKCE K POUŽITÍ: Kategorie uživatelů: Široká veřejnost (neprofesionál)

Způsob aplikace: Nástraha k přímému použití v deratizačních stanicích odolných proti násilnému otevření.

Aplikační dávky a četnost aplikací:

• **Myš domácí (*Mus musculus*)** - k použití ve vnitřních prostorách:

- Vysoká míra zamoření: do 50 g nástrahy na místo položení nástrahy každé 2 metry;

- Nízká míra zamoření: do 50 g nástrahy na místo položení nástrahy každých 5 metrů;

Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně jednou za 2 až 3 dny na zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhybnulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

• **Potkan obecný (*Rattus norvegicus*)** - k použití ve vnitřních prostorách a ve venkovních prostorách kolem budov:

- Vysoká míra zamoření: do 100 g nástrahy na místo položení nástrahy každých 5 metrů;

- Nízká míra zamoření: do 100 g nástrahy na místo položení nástrahy každých 10 metrů;

Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejdříve 5 až 7 dnů po zahájení deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhybnulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

K použití ve venkovních prostorách kolem budov: Umístěte deratizační staničky v prostorách, kde nehrozí záplavy.

Vyměřte nástrahu v deratizační staničce, pokud byla poškozena vodou nebo kontaminována nečistotami.

051867PAP1RR

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC: Tento přípravek obsahuje antikoagulační látku. Při jeho POŽITÍ se mohou objevit příznaky, a to se i zpožděním, mezi nímž může patřit krvácení z nosu a z dásní.

V závažných případech se mohou vyskytnout i krvení výrony a ve stolici a moči se může objevit krev. Antidotum: Vitamin K1 podávaný pouze zdravotnickými/veterinárními pracovníky.

V případě POTŘÍSNĚNÍ POKOŽKY omyjte pokožku vodou a následně vodou a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: vypláchněte oči roztokem na vyplachování očí nebo vodou a udržejte víčka otevřená po dobu nejméně 10 minut. PŘI ORÁLNÍ EXPOZICI vypláchněte ústa pečlivě vodou. Nikdy nepodávejte nic čísty osobě v bezvědomí. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. V případě poknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a lékaři ukažte obal nebo etiketu přípravku. Toxikologické informační středisko, Klinika pracovního lékařství, VFN a 1. LF UK, Na Bojstvi 1, 120 00, Praha 2, tel: 224 919 293, 224 915 402. V případě požití domácím zvířetem kontaktujte veterinárního lékaře. Nebezpečný pro volně žijící zvířata. Deratizační staničky musí být označeny těmito informacemi: „nepřemísťujte a neotvírejte“; obsahuje přípravek na hubení hlodavců“ RATIDIF SENSITIVE PASTA FLUO nebo číslo povolení CZ-0020139-0000; „účinná látka: difenakum“ a „v případě nehody zavolejte toxikologické středisko“ 224 919 293, 224 915 402.

INFORMACE: Vzhledem k jejich opožděnému působení jsou antikoagulační rodenticidy účinné 4 až 10 dnů po požití nástrahy. Hlodavci mohou přenést původce onemocnění. Nedotýkejte se uhybnulých hlodavců holo-lyma rukama, při jejich likvidaci použijte rukavice nebo nástroje, jako jsou např. kleště. Tento přípravek obsahuje hořkou látku a barvivo.

BEZPEČNÁ LIKVIDACE PŘÍPRAVKU A JEHO OBALU: Na konci deratizace odstraňte nespotebovanou nástrahu i obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě s výjimkou prázdných čistých obalů, které se mohou likvidovat jako odpad, který není nebezpečný. Katalog číslo odpadu: 20 01 19*Pesticidy, 15 01 10*Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné. Doporučuje se používat rukavice.

SKLADOVÁNÍ: Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chráňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na místech mimo dosah dětí, ptáků a domácích a hospodářských zvířat.

Držitel povolení / Dodavatel: ZAPI S.p.A, Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD), Itálie Tel.: +390499597737

Výhradní distributor: Papírna Moudrý, s.r.o., Nádražní 56, 667 01 Židlochovice, Česká republika Tel.: +420 547 231 064, moudry@moudry-cz.com, www.moudry-cz.com.

STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI: H373 Může způsobit poškození orgánů (krve) při prodloužené nebo opakované expozici.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/oseřeni.

P314 Nečtíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/oseřeni.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním dodavatelé s licenci na zneškodňování nebezpečných odpadů nebo na sberné místo, s výjimkou prázdných čistých obalů, které se mohou likvidovat jako odpad, který není nebezpečný.

POZOR



POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ: Před použitím přípravku si přečtěte informace o přípravku a rovněž veškeré informace přiložené k přípravku nebo poskytnuté v místě prodeje a řiďte se jimi. Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace (např. pasty). Odstraňte potraviny, které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné (např. rozsypané zrní nebo potravinový odpad). Kromě těchto opatření však zamořenou oblast těsně před zahájením deratizace nečistěte, neboť to populaci hlodavců jen vyruší a ztěžuje to akceptaci nástrahy.

Deratizační staničky je třeba umístit v bezprostřední blízkosti míst, kde byla zaznamenána aktivita hlodavců (např. stězky, hnízdiště, výkrmny, díry, nory atd.). Pokud je to možné, musí být deratizační staničky připraveny k zemi nebo k jiným konstrukcím. Neotevírejte sáčky obsahující nástrahu. Umístěte deratizační staničky mimo dosah dětí, ptáků, domácích zvířat, hospodářských zvířat a jiných nechtělých zvířat.

Neumísťujte deratizační staničky v blízkosti potravin, nápojů a krmiv ani nástrojů nebo povrchů, které s nimi přicházejí do kontaktu.



15 mm

30 mm

A - fascia B - retro 1 C - fronte D - retro 2 E - fianchi P - pinna